

¿Qué es el léntigo maligno melanoma (LMM)?

El LMM, constituye aproximadamente el 5 por ciento de los melanomas. Afecta a personas de edad avanzada y se localiza principalmente en zonas fotoexpuestas (cara, cuello y dorso de manos). Esto es debido a que en este tumor, el principal agente causal es el efecto acumulativo de las radiaciones solares, aunque también pueden intervenir otros factores.

El LMM se inicia como una mancha plana, hiperpigmentada, de tonos marrón, gris y negro, crecimiento periférico (crecimiento radial) y contornos muy irregulares. En algún momento, tras un periodo de latencia de varios años, comienza a invadir la piel en profundidad y aparecen sobre su superficie áreas sobreelevadas (crecimiento vertical). Puede alcanzar un tamaño de 3 a 20 cm o más y puede metastatizar, es decir, invadir otros órganos o ganglios.

Su diagnóstico precoz es fundamental, pues extirpándolo en su fase de crecimiento radial (o superficial) la curación es del 100%.

Los nombres y logos de la Academia Española de Dermatología son marcas registradas y no pueden utilizadas sin permiso. Esta información es exclusivamente un consejo médico y no reemplaza a una consulta con un dermatólogo profesional cualificado ya que cada paciente y cada caso específicos requieren atención personalizada.